Best's N Vass7R04s351-355

Collection Vassal-Montpellier

OMtp106

Best's N bl 7 R4 s 351.355











NOM Best's N EMPLACEMENT 7 134 1356 0

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	4 4 4 4 4	27 3 29.5 31.3 31.3 24.3	31.3× 31.3× 4,4° 4,4° 4,4°	0 0 1	1,0	26	SB 47	12.6	1,8	7,8 t3	11,8	11.9
Pou		ce: 0		2 Mill.	: 0	Port :	Mui	enge	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	/igueu	r : 4	

ANNEE 1990 Mi NOM Best'S N blane EMPLACEMENT 7 R 40. 351,355.

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1. 2 3.4 5	46668	19.3	26,3. 26,3. 26,3. 26,3. 2.4.	2 5 3 2	5	23.5	25,5	28.5	23,7	30.7	8,8	10.9.80 +5
Pourriture : O Mill. : O Port : jeuge Vigueur : 4												

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

Best's N 7R4 A-351-355 1.2

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 / moyen 183 - globuleux 184. Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 185 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/18 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve cu roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198,

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199/- séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ome et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre (14) - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220) - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo89

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Best's N 7R48-351-355(6.3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 88

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Best's N 7R42-351-3556-4)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté ble tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point péticlaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

-Calvoss

Best's N 7 R4 s. 351-355 (s.4) N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 15 x Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (3) A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long (76) A pédoncule herbacé 77)- mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 18 x17). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court [2]. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent (29) A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134 A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

-Calvo87

DENOMINATION : EMPLACEMENT : Best's N 7 Rus-351-3550.4

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2).

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3)

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (6)marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 88

N° d'ordre : Désignation : Best's N

Emplacement: 7 R4 A 351-355

```
: (1) -(2) - 3
Angle des nervures
                                   : 4 - 5 - 6
: 7 - 8 - 9
Sexe
L_1/L_2
                                   : (10) - (11)
L2/L
                                   : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes
                             : 17 - 18 - 19 - 20
: 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Sup.
Prof. sinus latéral Inf.
                                   : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                   : 267
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                    : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                    : (40) - (41)
Dents : forme
                                    : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                                    : (45) - (46) - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60 - 61 - 62
                                    : (63) - (64) - (65) - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90